

## TERMÉKISMERTETŐ

### CARBO ACTIVET® por Állatgyógyászati gyógyhatású készítmény

- A KÉSZÍTMÉNY NEVE**  
CARBO ACTIVET® POR
- TERMÉKFORMA**  
Belsőleges por
- A KÉSZÍTMÉNY ÖSSZETÉTELE**  
100 g termék tartalmaz:  
Aktívált szén (carbo activatus): 100 g
- CÉLÁLLAT FAJOK**  
Ló, csikó, szarvasmarha, borjú, juh, bány, kecske, gida, sertés, malac, kutya, macska, baromfi.
- A KÉSZÍTMÉNY FELHASZNÁLÁSI TERÜLETE, FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT, JAVALLATOK**  
A gyomor- bélcsatornába kerülő vagy ott képződő és még fel nem szívódott mérgek, toxikus hatású anyagcseretermékek, baktérium- és gombatoxinok megkötésének kiegészítő terápiájára, valamint különböző eredetű hasmenéses megbetegedések kiegészítő kezelésére.
- ADAGOLÁS ÉS ALKALMAZÁS MÓDJA**  
Adagolás:

Szopós borjúnak és csikónak:	naponta 3x20 g
Választott borjúnak és csikónak:	naponta 3x25-50 g
Lónak és szarvasmarhának:	naponta 2x200-300 g
Malacnak, bányának és gidának:	naponta 3x5-10 g
Sertésnek, juhnek és kecskének:	naponta 3x15-20 g
Kutyának életkortól és nagyságtól függően:	naponta 3x5-15 g
Macskának életkortól és nagyságtól függően:	naponta 3x0,5-1 g
Baromfinak életkortól és nagyságtól függően:	naponta 3x0,5-1 g

#### Alkalmazási mód

Szájon át, folyadékba (víz, tea vagy tej) vagy az állatok egyedi takarmányába, eleségébe keverve alkalmazandó. Lovaknak kizárólag szondán keresztül adható! Egyéb állatoknál súlyosabb esetben lehetőleg szondával juttassuk a gyomorba.

Kérődzők esetén hosszú nyakú üvegből, vagy oral-drenccsel, sertések részére híg vizes eleségbe vagy száraz takarmányba elkeverve, kutyának és macskának fecskendővel juttassuk be. Székrekedést okozó hatása miatt alkalmazása olyan hashajtóval együtt ajánlott, mely az adszorpciót nem befolyásolja ( pl.: nátrium-szulfát, paraffinolaj).

Egyéb gyógyszerek és az aktív szén beadása között legalább 1 órának el kell telnie. (Nagyfokú adszorpció hatás.) Szájon át beadott digitális tartalmú, valamint retard készítmények és az aktív szén beadása között legalább 3 órának el kell telnie.

**7. ELLENJAVALLATOK**

Maró anyagok okozta mérgezésekben ellenjavallt.

**8. MELLÉKHATÁSOK**

Az aktív szén obstipációt okozó hatása miatt olyan hashajtóval való együttadása javasolt, mely az adszorpciós képességet nem befolyásolja (pl. Nátrium-szulfát, paraffin olaj).

Ritkán egyéb gyomor-bélrendszeri panaszok (hányinger, hányás) előfordulhatnak.

**9. FIGYELMEZTETÉSEK**

Maró anyagok okozta mérgezésben mind hatástalansága, mind a gyengén megkötött toxikus anyag hosszabb ideig érvényesülő maró hatása miatt ellenjavallt.

A készítmény felhasználása során ügyeljünk arra, hogy annak esetlegesen képződő pora szembe, légutakba ne kerüljön. A készítmény pora erősen tapad a bőrhöz, de szappanos vízzel könnyen eltávolítható, esetleg fóliakesztyű használata javasolt.

A készítmény keveréktakarmány előállításához nem használható fel! Kizárólag az állatok egyedi kiegészítő kezelésére használható!

**10. LEJÁRATI IDŐ**

Felhasználható a gyártástól számított 2 évig.

Felbontás után, visszazárva a felbontástól számított 3 hónapig használható fel.

**11. TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK**

Eredeti csomagolásban, 15-25 °C között, száraz helyen, közvetlen napfénytől, ill. sugárzó hőtől védve tartandó.

**12. CSOMAGOLÁS**

Fekete műanyag flakonban, biztonsági zárókupakkal és kék műanyag garanciazáras csavaros tetővel zárva, előnyomott- és jelölt (gyártási szám, felhasználhatóság) öntapadós címkével ellátva. Kiszerezési egység: 100 g.

**13. GYERMEKEK ELŐL ELZÁRVA TARTANDÓ!**

**14. KIZÁRÓLAG ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI VAGY ÁLLATÁPOLÁSI CÉLRA!**

**15. A FEL NEM HASZNÁLT ANYAG ÉS A HULLADÉK KEZELÉSÉNEK MÓDJA**

A fel nem használt készítményt, valamint a keletkező hulladékokat a helyi követelményeknek megfelelően kell megsemmisíteni.

**16. A GYÁRTÓ ÉS A FORGALMAZÓ NEVE ÉS CÍME**

A termék forgalmazója:

Bács-Vet Kft. 6070 Izsák, Kossuth L. u. 60.

Gyártó:

Fanatik Kft. 1211 Budapest, Terelő u. 44.

**17. NYILVÁNTARTÁSI SZÁM**

003/1/2010 MgSzH ÁTI (100 g)