

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Aniprantel Cat 230/20 tabletta macskák részére A.U.V.

1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS GYÁRTÓNAK A NEVE ÉS CÍME

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

Pharma VIM Kft., 1029 Budapest, Adyliget, Pipitér u. 5.

A gyártási tételek felszabadításáért felelős gyártó:

Vim Spectrum SRL, 547367, Koronka, Segesvári út 409, Románia

2. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE

Aniprantel Cat 230/20 tabletta macskák részére A.U.V.

Pirantel-embonát, prazikvantel

3. HATÓANYAGOK ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE

Egy tabletta tartalmaz:

Hatóanyagok:

Pirantel-embonát 230 mg

Prazikvantel 20 mg

4. JAVALLAT(OK)

Széles spektrumú anthelmintikum macskák kevert fonál- és galandféreg fertőzöttségének a kezelésére:

Orsóférgesség: *Toxocara cati*, *Toxascaris leonina* (fiatal alakok ellen is)

Kampósféreg-fertőzöttség: *Ancylostoma tubaeforme*, *Uncinaria stenocephala*

Galandférgesség: *Echinococcus multilocularis*, *Taenia* spp., *Dipylidium caninum* (fiatal alakok ellen is)

5. ELLENJAVALLATOK

Nem alkalmazható a hatóanyagokkal vagy bármely segédanyaggal szembeni túlérzékenység esetén.

6. MELLÉKHATÁSOK

A készítmény akut toxicitása > 2000 mg/ttkg. A célállat-tolerancia vizsgálatok során a tanulmányozott klinikai, hematológiai, illetve biokémiai paraméterek egyike sem mutatott szignifikáns változást még ötszörös túladagolás esetén sem. Mellékhatások a klinikai vizsgálatok során sem mutatkoztak.

Ha bármilyen mellékhatást észlel, még ha az nem is szerepel ebben a használati utasításban, vagy úgy gondolja, hogy a készítmény nem hatott, értesítse erről a kezelő állatorvost!

7. CÉLÁLLAT FAJ(OK)

Macska

8. ADAGOLÁS, ALKALMAZÁSI MÓD(OK) CÉLÁLLAT FAJONKÉNT

Adagolás:

4 testtömeg kilogrammonként 1 tabletta

< 2 kg 1/2 tabletta

2-4 kg 1 tabletta

4-8 kg 2 tabletta

Alkalmazás módja:

Szájon át történő alkalmazásra. A tabletta közvetlenül a szájba vagy erre alkalmas táplálékba (egy darab húsba, kolbászba, stb.) helyezve adható be. Koplaltatás az adagolás előtt nem szükséges.

9. A HELYES ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ JAVASLAT

A szokásos féregtelenítéshez 1 kezelés elegendő.

Az újr fertőződés veszélye miatt a megelőző kezelést 3 havonta célszerű elvégezni.

10. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ

Nem értelmezhető.



11. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

Gyermekek elől gondosan el kell zárni!

Az eredeti csomagolásban, 25°C alatt tárolandó.

Ezt az állatgyógyászati készítményt csak a fóliacsíkon és a dobozon feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni!

A lejárati idő az adott hónap utolsó napjára vonatkozik.

12. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS(EK)

Különleges figyelmeztetések minden célállat fajra vonatkozóan:

A bolha egy gyakori galandféregfaj, a *Dipylidium caninum* köztigazdája.

A köztigazdák (pl. bolhák, egerek, stb.) elleni védekezés hiányában bizonyosan kiújul a galandféreg fertőzöttség.

Ügyelni kell az alábbiak mellőzésére, mivel növelhetik a rezisztencia kialakulásának kockázatát és végső soron a kezelés hatástalanságát eredményezhetik:

- ugyanabba a csoportba tartozó anthelmintikumok túlságosan gyakori, ismételt alkalmazása hosszabb időszakon át,
- aluldozírozás a testtömeg alulbecslése vagy a készítmény helytelen alkalmazása miatt.

A kezelt állatokra vonatkozó különleges óvintézkedések:

A pirantel tartalmú szerek csak elővigyázatosan adhatók kachexiás állatoknak.

Az állatok kezelését végző személyre vonatkozó különleges óvintézkedések:

Az általános munkavédelmi óvrendszabályokat kell betartani!

Véletlen lenyelés esetén haladéktalanul orvoshoz kell fordulni, bemutató a készítmény használati utasítását vagy címkéjét.

Prazikvantel vagy pirantel-embonát iránti ismert túlérzékenység esetén kerülni kell az állatgyógyászati szerrel való érintkezést.

Az állatokat a tabletta beadása után 24 óráig javasolt zárt helyen tartani, és az ürített bélsarat, férgeket, féregízeket, petéket megsemmisíteni.

Javasolt az állat környezetét gyakran takarítani és fertőtleníteni, majd alaposan kezét mosni. A kezelést követő napokban a gyerekeket távol kell tartani a macskáktól.

Az echinokokkózis az emberekre is veszélyes. Mivel az echinokokkózis az Állategészségügyi Világszervezetnél (OIE) bejelentendő betegség, a kezelésre és gondozásra, valamint az emberek védelmére különleges iránymutatások érvényesek, amelyeket a megfelelő illetékes hatóságtól kell beszerezni.

Vemhesség:

Vemhesség ideje alatt alkalmazható.

Gyógyszerkölesönhatások és egyéb interakciók:

A pirantel bázis és a piperazin vegyületek közötti antagonisták hatás miatt a készítmény nem alkalmazható piperazinnal egyidejűleg. Hasonlóképpen nem használható együtt szerves foszforsavészterekkel és dietilkarbamazinnal. A pirantelhez hasonló hatásmechanizmus és toxikológiai sajátosságok miatt kerülni kell a készítmény morantellel és levamisollal való együttes használatát.

Túladagolás (tünetek, sürgősségi intézkedések, antidotumok):

A készítmény túladagolása gyakorlati körülmények között igen ritkán fordulhat elő, a preparátum széles terápiás sávja miatt. Amennyiben az extrém túladagolás miatt feltételezett toxikus hatásra utaló tünetek jelentkeznek, szükség esetén tüneti kezelést kell végezni.

Inkompatibilitások:

Nem ismert.

13. A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKAINAK ÁRTALMATLANNÁ TÉTELÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK (AMENNYIBEN SZÜKSÉGESEK)

Az Aniprantel Cat nem kerülhet természetes vizekbe, mert veszélyes lehet a halakra és más vízi élőlényekre.

Kérdezze meg a kezelő állatorvost, gyógyszerészt, hogy milyen módon semmisítse meg a továbbiakban nem szükséges állatgyógyászati készítményeket! Ezek az intézkedések a környezetet védik.

14. A HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK IDŐPONTJA

2018. szeptember 26.

15. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra. Állatorvosi vény nélkül kiadható.

Törzskönyvi szám

3464/1/14 NÉBIH ÁTI (5x2)

A közvetlen csomagolás jellege és elemei

5x2 tabletta fóliacsíkból és papírdobozban.

